



POMERES

Carpocapsa

Fer un tractament entre **ara amb**:

CARPOVIRUSINA , per larves recent eclosionades.

O bé,

CLORPIRIFOS , larves formades.

Poll de Sant Josep

A finals de maig i principis de juny caldrà tractar per la primera generació de poll amb :

CLORPIRIFOS

Bitter-pit

Continueu fent tractaments de calci per evitar el Bitter-pit.

**RECORDEU : ÚLTIM DIA PER A FER PARTE DE MAL QUALLAT EN
POMA I PERA ÉS EL 15 DE MAIG**

PERERA

Psil·la i fil·loxera

Cal vigilar les poblacions de psil·la, sobre tot la pera Blanquilla degut a la quantitat de llucs que tenen. Consulteu amb el tècnic el moment de fer el tractament. Productes:

ABAMECTINA + IMIDACLOPRID (o CLORPIRIFOS per carpocapsa o poll)

PANÍS

herbicides post emergència

*Fulla ampla (Dicotiledònies),

STARANE, sols per soja borda (Abutilon)

BANVEL, per a blets, caxurros, currioles.

BUCTRIL, per plantes petites (pot provocar fitotoxicitat en panís)

CALLISTO, per totes (fer atenció amb la barreja amb NICOSULFURON provocar fitotoxicitat en panís)

*Fulla estreta (Monocotiledònies),

NICOSULFURON (ELITE, SAJON), per mel·loca (Sorgum) i panissoles petites.

CUBIX, per mel·loca.

Teniu en compte que les barreges per fulla ampla amb NICOSULFURON potencien més l'efecte herbicida dels components.

Enguany hi ha al mercat una formulació de NICOSULFURON del 6%, a més de l'habitual del 4 %. No hi ha cap diferència en l'eficàcia, tant sols vigileu quina formulació feu anar a l'hora de dosificar l'aplicació.