

DIVERSIFICACIÓ DE CULTIUS

Es recorda als socis que vulguin sembrar cultius herbacis en terres de secà i/o regadiu que han de complir amb els següents **requisits de diversificació**:

SUPERFÍCIE DE CULTIUS HERBACIS I GUARET	NOMBRE MÍNIM DE CULTIUS	SUPERFÍCIE MÀXIMA	
		CULTIU PRINCIPAL	DOS CULTIUS PRINCIPALS
Menor de 10 ha	-	-	-
Entre 10 i 30 ha	2	75% del total	-
Major de 30 ha	3	75% del total	95% del total

SUPERFÍCIE D'INTERÈS ECOLÒGIC (SIE)

Les explotacions que declarin més de 15 ha de cultius herbacis i guaret (independentment del nombre de drets que es tinguin) han de deixar almenys un 5% de superfície d'interès ecològic (SIE). Es considera SIE:

1) GUARET: durant 9 mesos consecutius (entre Octubre 2016 i Setembre 2017).

2) CULTIUS FIXADORS DE NITROGEN (LLEGUMINOSES):

- Gra per a consum humà o animal: mongeta, cigrons, pèsol, faves, veça, etc.
- Farratgeres: alfals, veça, trepadella, etc.

ATENCIÓ: després de collir la SIE s'ha de sembrar un cereal. No es pot deixar la parcel·la en guaret ni es pot tornar a sembrar una altra lleguminosa.

VARIETATS DE CEREAL D'HIVERN

Basats en la nostra experiència i els resultats dels assajos de varietats de l'IRTA, es recomanen les següents varietats de cereal d'hivern:

CULTIU	REGADIU	SECÀ
ORDI	GUSTAV SCRABBLE CHRISTOPHER	GUSTAV LAGALIA NURE
BLAT	GARCIA RIMBAUD SOISSONS ALHAMBRA COSMIC NEMO	IDALGO SOISSON NUDEL

ROTACIÓ DE CULTIUS

La rotació de cultius millora l'estructura del sòl, facilita el control de males herbes, i incrementa el rendiment del cultiu següent. Es poden considerar aquestes opcions:

- **COLZA:** crucífera amb arrel pivotant i profunda. Es recomanen sèmbrs primerenques perquè el cultiu arribi a l'hivern a l'estadi de roseta. Per varietats, consultar al servei tècnic.
- **PÈSOL:** lleguminosa, fixa nitrogen, permet la doble collita amb panís i compta com a SIE per la DUN. Sèmbrs tardanes poden ser una opció en secans amb problemes d'escaldaboques. Varietats recomanades: *Audit*, *Isard*, *Mythic*.



MOSCA DE L'OLIVERA I ALTRES PLAGUES

En cas de presència, es poden aplicar els següents productes:

PRODUCTE	MATÈRIA ACTIVA	DOSI c/1000L	PS
SUPERDELTA	Deltametrina 2,5%	500 cc	3
BULLDOCK	Betaciflutrina 2,5%	800 cc	14
PERFEKTHION	Dimetoat 40%	150 cc	60



FOC BACTERIÀ

Malaltia greu que afecta principalment a pereres i pomeres. Síntomes: aspecte de cremat de les fulles, xancres en troncs i branques, exsudats mocosos.

Mesures preventives:

- Eliminació de les possibles refluoracions de tardor.
- Tractaments de tardor amb **productes que continguin coure** com Oxiclòrid de Coure 50% (400 g/1000 L) o amb **Fosetil d'al·lumini 80%** (300 g/1000 L)
- En cas d'observar símptomes, comunicar-ho immediatament al servei tècnic.



Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Sebastian Cela 663 708 753