

HERBICIDA EN CEREAL D'HIVERN

Es presenten possibles estratègies per a controlar males herbes en cereals d'hivern:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER ha	FULLA AMPLA	MARGALL	COGULA	ESCALDA-BOQUES	OBSERVACIONS
POSTA	Tifensulfuron-metil 33,3% + Tribenuron-metil 16,7%	45-65 g	SI	-	-	-	Afegir un mullant
GRANSTAR SUPER 50SX	Tifensulfuron-metil 25% + Tribenuron-metil 25%	40-60 g	SI	-	-	-	Afegir un mullant
IMAGE GOLD, DRIWER...	Bromoxinil 12% + Mecoprop-p 18%	2 L	SI	-	-	-	-
INTENSITY	Aminopiraliid 30% + Florasulam 15%	33 g	SI	-	-	-	Residual. Afegir "PG Supermojante"
MUSTANG	2,4-D Acido 30% + Florasulam 0,62%	500 – 750 cc	SI	-	-	-	Aplicar a +20°C
AXIAL PRO	Pinoxaden 6%	0,5 – 1 L	-	SI	SI	-	-
HUSSAR PLUS	Iodosulfuron-metil-sodio 5% + mesosulfuron-metil 0,75%	150 – 175 cc	SI	SI	SI	-	Afegir 800 cc/ha de Biopower (mullant).
GANATER, ESTACA...	Diflufenican 40% + Iodosulfuron-metil-sodio 5% + Florasulam 2%	150 – 200 g	SI	SI	SI	-	-
PACÍFICA PLUS	Iodosulfuron-metil-sodio 1% + Amidosulfurón 5% + Mesosulfuron-metil 3%	300 – 500 g	SI	SI	SI	SI	Aplicar al blat, triticales. Afegir 800 cc/ha Biopower (mullant).
BROADWAY	Florasulam 1,42% + Piroxsulam 7,08%	265 g	SI	SI	SI	SI	Aplicar al blat, triticales. Afegir "Supermojante". No controla roella resistant

Per ajustar les dosis a cada finca en concret, consultar al servei tècnic.

ADOBAT DE COBERTORA EN CEREAL D'HIVERN

L'aplicació de nitrogen en cobertora és més eficient que abans de la sembra. Orientativament, es poden aplicar les següents quantitats:

PRODUCTE	Dosi per Jornal
N32 líquid	150 – 180 kg
Nitrosulfat amònic 26%	180 – 220 kg
Purí de porcs d'engreix	10 - 15 m ³

Com l'any passat, aquestes dosis es poden ajustar amb una analítica de nitrats al sòl (gratuïta per als socis). Interessats consultar al servei tècnic.

ZABRUS EN CEREAL D'HIVERN

En cas de presència de *Zabrus* (muntets de terra al voltant de les plàntules, tiges rossegades), es pot aplicar Betaciflutrin 2,5% (BULLDOCK 0,5 L/ha) o Deltametrina 2.5% (DECIS o SUPERDELTA a 0,5 L/ha).



BANDES DE COLOR EN CEREAL D'HIVERN

Si es donen dies de gran amplitud tèrmica o en cas de naixença complicada (sembra massa profunda, etc.), es poden observar bandes alternades de color verd i groc en el coleòptil o en les primeres fulles del cereal d'hivern. Aquestes bandes de color solen ser temporals i no condicionen el rendiment.



ADOBAT DE L'ALFALS

En funció de l'any i de la previsió de collita, proposem l'adob següent per fer les aportacions de N-P-K:

PRODUCTE	(kg/Jornal)
BARREJA 0-6-42	300-350

RECORDATORI ASSEGURANÇA FRUITA

Es recorda que el període de contractació de l'assegurança d'explotació en fruiters finalitza el proper 28 de febrer. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.

CORREU ELECTRÒNIC

Si voleu rebre aquesta circular per correu electrònic, feu-nos arribar la vostra adreça d'e-mail, i us incorporarem a la base de distribució.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Sebastian Cela 663 708 753