


TRACTAMENT PRE-FLORAL POMERA

Durant l'estadi E-E3 es pot fer l'aplicació dels següents productes:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/ 1000 L	CONTROLA
Coure, ●	Varis	-	Bacteriosi (Coure),
Tiram 80%	Thiram, etc	2,5 kg	<i>Monilia</i> , Mota
Oli de parafina 83%	Ovitex, etc.	10 L	Cotxinilles
Fonicamid 50%	Teppeki	140 g	Pugons
Piriproxifen 10%, ●	Alazin, etc.	0,5 L	Poll de San José
Metil Clorpirifos 22,4%	Reldan	4 L	
Tebuconazol 20%, ●	Orius, etc.	500 cc	Mota, Cendrós
Miclobutanil 24%	Sythane, etc.	250 cc	



TRACTAMENT QUALLAT PERERA

Es proposen 2 estratègies. A més a més, serà necessari afegir un MULLANT i un ADOB FOLIAR RIC EN BOR I AMINOÀCIDS per a millorar el quallat.

Estratègia 1: PASTILLA: àcid giberel·lic 1 gr

Varietat	1a. APLICACIÓ		2a. APLICACIÓ		Podeu substituir el primer tractament per FENGIB (dosi per 1000 L)
	Pastilla/ 1000 L	% F2 (Floració)	Pastilla/ 1000 L	% F2 (Floració)	
<i>Alexandrina</i>	2	30	1	80	500 cc
<i>Barlett</i>	NO	NO	0,5	80	450 cc
<i>Blanquilla</i>	3	30	2	80	1000 cc
<i>Conference</i>	NO	NO	1	80	450 cc
<i>Devoe</i>	1	30	1	80	400 cc (tractament únic 60% F)
<i>Decana de comice</i>	3	30	2	80	600 cc (tractament únic 60% F)
<i>Delbard première</i>	NO	NO	0,5	80	-
<i>Ercolini</i>	1	30	1	80	400 cc
<i>General leclerc</i>	2	30	1	80	-
<i>Williams</i>	NO	NO	0,5	80	450 cc

Estratègia 2: PROMALIN: 6-Benziladenina (BA) 1,9% + Giberelines (AG4 +AG7) 1 %

VARIETAT	25% de F2 PROMALIN (cc %)	50% de F2 PROMALIN (cc %)	80% de F2 PROMALIN (cc %)
<i>Conference</i>	25	NO	25
<i>Abate Fetel</i>	25	25	25

HERBICIDES DE PRE-EMERGÈNCIA EN PANÍS

Es proposen les següents estratègies a aplicar en pre-emergència:

MARCA COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER	
		Jornal	ha
CAMIX	Mesotriona 4% + S-metolacloro 40%	1,6 L	3,75 L
PRIMEXTRA GOLD	S-Metolacloro 31,25% + Terbutilazina 18,75%	1,75 L	4 L
WING-P	Dimetenamida-P 21,25% + Pendimetalina 25%	1,75 L	4 L
SPADE FLEXX	Isoxaflutol 24%	0,43 cc	1 L
LAGON	Aclonifen 50% + Isoxaflutol 7,5%	0,43 cc	1 L

VARIETATS DE PANÍS

En base a l'experiència pròpia i als resultats de la xarxa de varietats de l'IRTA, recomanem les següents varietats, entre d'altres:

Cicle 700: DKC 6729YG, IXABEL, KAYRAS YG, NYSTAR (YG), P1570(Y)...

Cicle 600: CHARLESTON, PR33Y72...

REDUCCIÓ RISC DE MICOTOXINES EN PANÍS

Es recomana fer rotació de cultius en finques que portin molts anys seguits de panís. Les varietats transgèniques semblen disminuir el risc d'aparició de micotoxines. En finques problemàtiques, es pot avançar la data de sembra i sembrar cicles més curts.

ANÀLISI DE NITRATS EN COBERTORA DE PANÍS

Per estimar la quantitat d'adob nitrogenat a aplicar en cobertura, es pot fer una analítica de nitrats (gratuïta per als socis) quan el panís tingui entre 2 i 3 fulles. Per qualsevol consulta, consulteu al servei tècnic.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Sebastian Cela 663 708 753