

MALALTIES EN PERA I POMA

En presència de **fongs**, es pot aplicar **UN** dels següents tractaments:

PERA

JUSTIFICACIÓ	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/1000 L	PS (DIES)
Stemphylium, altres malalties	Boscalida 25,2% + Piraclostrobin 12,8%	Bellis	800 cc	7
Diverses malalties	Fludioxonil 50%	Geoxe	500 cc	3

POMA (NOMÉS EN FINQUES AMB MOTEJAT GREU)

JUSTIFICACIÓ	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/1000 L	PS (DIES)
Motejat (Grup Fuji)	Mancozeb 80%	Dithane	2 kg	28
	Captan 80%	Varis...	1,5 kg	28
Motejat (resta de varietats)	Difenoconazol 25%	Score, Torre...	200 cc	14
	Ciproconazol 10%	Atemi	200 cc	14

Teniu en compte el PS de 28 dies dels fungicides orgànics (captan, mancozeb) per possible tractaments per mota.

PLAGUES EN PERA I POMA

PSIL·LA EN PERA. Si s'observa psil·la, es recomana netejar amb sabó (4 L/1000), i si fes falta, tractar amb Abamectina 1,8% (1 L/1000 L), afegint-ne un mullant. PS= 3 dies (Apache, Bersite, Arya), 28 dies (Abasi).

MOSCA. En general, les captures de mosca es troben per sota dels nivells de l'any passat.

CARPOCAPSA. Es preveu que la tercera generació comenci el vol el 8/8, i els ous eclosionin a mitjans d'agost. Per controlar aquestes plagues, es poden aplicar **UN** dels següents productes:

JUSTIFICACIÓ	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/1000 L	PS (DIES)
Carpocapsa, mosca	Deltametrin 2% + Tiacloprid 15%	Proteus	500-600 cc	7
	Betaciflutrin 2,5%	Bulldock	500-700 cc	7
	Lambda Cihalotrin 1,5%	Karate Zeon 1,5CS	1 L	7
	Deltametrina 2,5%	Superdelta	300-500 cc	3
Carpocapsa	Metil clorpirifos 22,4%	Sentosan, Foque	3 L	15
	Virus granulosi carpocapsa	Carpovirusina	1,5 L	-

ARANYA. Consultar als tècnics abans de tractar.

CANDAU

En cas de problemes de caiguda de fruits, aplicar ANA 1% una setmana abans de collir. Tractar al vespre i afegir un mullant.

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	VARIETAT	DOSI C/1000 L
Ana 1%	Rhodofix o Etifix	Conference	1,5 kg
		Alexandrina	1 - 1,25 kg
		Pomes grup roges	2 kg
		Grup Golden	1,5 - 2 kg

La durada és de 12 a 15 dies. Es pot repetir el tractament si als 15 - 18 dies encara hi ha fruita sense collir.

MESURES CULTURALS PER MOSCA

Les mesures culturals són tant o més efectives que els tractaments químics. Recordeu, en cas d'atac, **eliminar tota la fruita de la finca un cop recol·lectada**. Evitar tirar-la a terra i passar la picadora.

La raó és que la mosca de la fruita fa la posta als fruits madurs romanents a la finca, a partir dels quals es generen nous adults que poden afectar altres plantacions.

Per qui faci captura massiva, també es recomana mantenir els pots a la finca fins a finals de novembre, per disminuir els nivells de la mosca.

PLAGUES EN PANIS

S'han observat finques de panís de segona collita amb oruga (Helicoverpa, Mythimna). Podeu tractar amb **UN** dels següents productes:



MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI /JORNAL
Lambda Cihalotrin 1,5%	Karate Zeon 1,5CS	170 cc
Deltametrina 2,5%	Superdelta	65 cc
Cipermetrina 10%	Poly-10	320 cc

PUGÓ EN ALFALS

Per controlar pugó en alfals, es pot aplicar Epik (Acetamiprid 20%), a 100 g/ha.

DEJECCIONS RAMADERES

Recordem que està prohibit aplicar dejeccions ramaderes durant el mes d'agost, excepte si s'ha de sembrar algun cultiu durant el mes de setembre.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917

Sebastian Cela 663 708 753* Maria Rosa Llombart 674325308