

DUN 2018 - NOVETATS

Les explotacions de més de 15 ha de terra campa han de comptar amb un 5% de superfície d'interès ecològic (SIE). De cara a la DUN 2018, computaran com a SIE:

GUARET:

- durant 6 mesos consecutius entre l'1 de gener i el 30 de setembre.
- durant aquest període queda prohibit aplicar productes fitosanitaris.

CULTIUS FIXADORS DE NITROGEN (CFN):

- són lleguminoses per a gra o farratge, com ara alfals, veces, pèsol, etc.
- es permeten barreges de CFN amb cultius no fixadors (per exemple, veça-civada) si la lleguminosa és predominant (més del 50%).
- els CFN es mantindran al camp almenys fins a floració.
- es prohibeix l'ús de productes fitosanitaris en CFN que es computin com a SIE, des de la tardor de 2017 fins a finalitzar la collita.
- està permès l'ús de fertilitzants químics, orgànics o inorgànics.
- un recinte de CFN no es podrà dedicar a guaret l'any següent. En canvi, sí que es pot repetir un CFN darrere un CFN.

A la sol·licitud de la DUN 2018, s'haurà de signar una *declaració responsable* en la que hi consti que es coneix la prohibició de l'ús de productes fitosanitaris en aquestes SIE.

VARIETATS DE CEREALS D'HIVERN, PÈSOL I COLZA

En base a la nostra experiència i als resultats d'assajos tècnics i varietals, es recomanen les següents varietats de cereal d'hivern:

CULTIU	REGADIU	SECÀ
ORDI	Gustav, Scrabble, Cristhopher	Gustav
BLAT	Garcia, Rimbaud, Alhambra, Cosmic, Nemo, Soissons	Nudel, Soissons
PÈSOL	Audit, Furious	Audit, Furious
COLZA	Diffussion, Es Hydromel	Diffussion, Es Hydromel

HERBICIDA PREEMERGÈNCIA EN COLZA

En preemergència o postemergència precoç, es pot aplicar:

JUSTIFICACIÓ	NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER ha
Males herbes FA i FE	RAPSAN	Metazacloro 50%	2 L

NITRATS AL SÒL EN POSTCOLLITA DE PANÍS

POSTCOLLITA DE PANÍS: Valors superiors a 45 ppm de nitrogen nítric al sòl durant els 30 dies posteriors a la collita del panís indiquen sobrefertilització (Decret 136/2009). Els socis que ho desitgin poden fer, gratuïtament, una **anàlisi de nitrats al sòl** després de la collita del panís per comprovar si s'ha sobrefertilitzat, i en aquest cas, ajustar les dosis de cara al cultiu de panís de l'any següent.

ADOBAT DEL CEREAL D'HIVERN

Per ajustar l'adobat de fons del cereal d'hivern, es recomana fer un **anàlisi de NPK al sòl**. Si no se'n disposa, es recomana genèricament aplicar uns *250-300 kg/jornal (500-700 kg/ha) de 10-10-20*. L'anàlisi de nitrats al sòl que ofereix gratuïtament Cooperativa d'Ivars està disponible per a tots els socis, tot i que es recomana fer-lo uns quants dies abans d'aplicar l'adobat de cobertura del cereal.

MOSCA DE L'OLIVERA

En cas de presència, es pot tractar amb alguns dels següents productes:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER 1000 L	TS (dies)
PERFEKTHION	Dimetoat 40%	150 cc	60
IMIDAN WP	Fosmet 50%	150 g	21
SUPER DELTA	Deltametrin 2,5%	500 cc	3

PHYTOPHTORA I BACTERIOSI EN FRUITERS DE LLAVOR

En postcollita de fruiters de llavor es recomana aplicar Fosetil-Al per prevenir atacs de *phytophthora* i foc bacterià.

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER 1000 L
ALIETTE, ALFIL, ...	Fosetil-Al 80%	2,5 kg

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Sebastian Cela 663 708 753