

**TRACTAMENT PRE-FLORAL EN PERERA**



ESTADI VEGETATIU	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
ESTADI E – E2	Oli de parafina	<b>OVITEX, Varis</b>
	Piriproxifen	<b>ALAZIN, Varis</b>
	Oxiclorur de coure	<b>MICRORAM, Varis</b>
	Abamectina	<b>APACHE, MARISOL, Varis</b>

Recompte de Psil·la: L'ocupació de lamburdes és d'un 10 a un 15% de posta. Hem observat ja inici d'eclosió de les primeres ninfes.

**TRACTAMENT PRE-FLORAL EN POMERA**



ESTADI VEGETATIU	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
ESTADI E – E3	Oli de parafina	<b>OVITEX, VARIS</b>
	Flonicamid	<b>TEPPEKI</b>
	Piriproxifen	<b>ALAZIN, Varis</b>
	Oxiclorur de coure	<b>MICRORAM, Varis</b>
	Sistèmic (mota/cendrosa)	<b>ORIOUS, SHAMI ...</b>

**TRACTAMENT CAIGUDA DE PÈTALS PINYOL**

CONTROL	MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE	DOSI PER 1000
Monilia, cendrosa,	Tebuconazol o Fluopyram+Tebuconazol	<b>ORIOUS o LUNA EXPERIENCE</b>	500 cc 500 cc
Cribat	Mancozeb	<b>NUFOZEBE, Varis</b>	2 Kg
Cendrosa	Sofre	<b>COSAVET, KUMULUS</b>	5 Kg
Pugons i trips	Acetamiprid	<b>SIKORI, CARNADINE</b>	250-350 g/cc

**TRACTAMENTS HOPLOCAMPA EN PERA**

És aconsellable afegir un producte específic per aquesta plaga que respecti els pol·linitzants, juntament amb un tractament per quallat, sobretot en finques amb antecedents.

PRODUCTE			Dosi per 1000 L
Pugons	Tau-fluvalinat	<b>KLARTAN 24</b>	200 cc

## TRACTAMENTS QUALLATS EN PERA

### A) ESTRATÈGIA 1. Amb PASTILLA: Àcid giberèl·lic 1 g

Varietats	1ª Aplicació		2ª Aplicació		Podeu substituir el primer tractament de pastilla per FENGIB (*) per 1000 L
	Pastilles per 1000 L	% Floració	Pastilles per 1000 L	% Floració	
<i>Alexandrina</i>	2	30 %	1	80 %	500 cc
<i>Bartlett</i>	NO	NO	0,5	80 %	450 cc
<i>Blanquilla</i>	3	30 %	2	80 %	1000 cc
<i>Conference</i>	NO	NO	1	80 %	500 cc
<i>Devoe</i>	1	30 %	1	80 %	400 cc (tractament únic al 60% floració)
<i>Decana de Comice</i>	3	30 %	2	80 %	600 cc (tractament únic al 60% floració)
<i>Delbard Première</i>	NO	NO	0.5	80 %	-
<i>Ercolini</i>	1	30 %	1	80 %	400 cc
<i>General Leclerc</i>	2	30 %	1	80 %	-
<i>William's</i>	NO	NO	0,5	80 %	450 cc

(\*) És important no barrejar amb **FENGIB** cap adob foliar ric en nitrogen ni aminoàcids. Tampoc ho apliqueu després d'una gelada.

### B) ESTRATÈGIA 2. Amb PROMALIN: 6-Benziladenina + Giberelines (GA4 + GA 7)

	1ª Aplicació 30% floració	2ª Aplicació 80% floració
	<i>PROMALIN per 1000 L</i>	<i>PROMALIN per 1000 L</i>
<i>Conference</i>	250 cc	250 cc

	1ª Aplicació 20% floració	2ª Aplicació 50% floració	3ª Aplicació 80% floració
	<i>PROMALIN per 1000 L</i>	<i>PROMALIN per 1000 L</i>	<i>PROMALIN per 1000 L</i>
<i>Abate Fetel</i>	250 cc	250 cc	250 cc

*Passats 20 dies de caiguda de pètals tractar amb REGALIS PLUS a 1 kg/1000*

### C) ESTRATÈGIA 3. Amb AGRITONE: ANA 0,43% + ANA AMIDA 1,18%

	1ª Aplicació 20% floració	2ª Aplicació 80% floració	3ª Aplicació caiguda petals
	<i>AGRITONE per 1000 L</i>	<i>AGRITONE per 1000 L</i>	<i>AGRITONE per 1000 L</i>
<i>Conference i Devoe</i>	600 cc	600 cc	600 cc

En tots els tractaments de quallat és aconsellable afegir un MULLANT i un adob ric en Bor, Fòsfor i Aminoàcids per millorar l'efecte del quallat.

**Serveis Tècnics. Secció Agrícola.**

**Rafael Pina 607 193 239 \* Mar Ribalta 652 095 917\* Albert Alsina 637 897 570**

**Sebastian Cela 663 708 753\* Maria Rosa Llombart 674325308**

## TRACTAMENTS FUNGICIDES EN CEREAL D'HIVERN

Les humitats altes i la pujada de temperatures de finals d'hivern fan que s'hagi d'estar alerta en l'augment de fongs en cereal d'hivern.

### CRITERIS DE PROTECCIÓ SEGONS CONTRIBUCIÓ AL RENDIMENT FINAL

#### Ordi. Influència en rendiment

Durant l'estadi previ al **fillolament i fins a l'encanyat** és quan s'ha d'incidir en la prevenció de les malalties fúngiques. L'aplicació de fungicides en aquests estadis millorarà el rendiment final.

#### Blat. Influència en rendiment

A diferència de l'ordi, l'estadi més susceptible per infestacions de malalties fúngiques **és durant l'aparició de la fulla bandera**. És en aquest moment quan es recomana l'aplicació de fungicides.

Les propostes de tractament són les següents:

MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE	DOSI PER ha
Tebuconazol	<b>WISTER, ORIUS</b>	1 L
Proti-conazol+Tebuconazol	<b>PROSARO</b>	1 L
Bixafen + Proti-conazol	<b>AVIATOR</b>	1 L
Azoxistrobin	<b>AMISTAR, ORTIVA</b>	1 L

