






FENOLOGIA

				
Botó rosa (Estadi E - E2)		Floració	Caiguda de petàls	Quallat

TRACTAMENT PRE-FLORAL EN PERERA

ESTADI VEGETATIU	MATERIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
ESTADI E - E2 BOTÓ ROSA	Oli de parafina	LAINCOIL, varis
	Piriproxifen	BRAI, PROXIMO, varis
	Oxiclорur de coure	COBRE LAINCO, OSSIRAM 50 ,Varis

PSIL·LA

En els recomptes realitzats sobre lamburdes podem trobar posta blanca i groga amb un percentatge d'ocupació del 15 al 25 per cent. Es recomana realitzar un tractament al inici d'eclosió d'aquesta posta hivernant

MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE	DOSIS per 1000 L
Aminoàcids	SYNERGY	3 L
Lambda Cihalotrin	KARATE ZEON	0,7 L
o	o	o
Deltametrin	SUPERDELTA, INFISS	0,5 L

HOPLOCAMPA

En finques amb poca floració i amb danys la campanya anterior, es recomana fer un tractament amb botó blanc i repetir durant la floració Consultar al servei tècnic l'estratègia a seguir

**TRACTAMENTS QUALLATS EN PERA**

A) ESTRATÈGIA 1. Amb PASTILLA: Àcid giberèl·lic 1g

Varietats	1 ^a Aplicació		2 ^a Aplicació		Podeu substituir el primer tractament de pastilla per FENGIB (*) per 1000 L
	Pastilles per 1000 L	% Floració	Pastilles per 1000 L	% Floració	
Alexandrina	2	30 %	1	80 %	500 cc
Bartlett	NO	NO	0.5	80 %	450 cc
Blanquilla	3	30 %	2	80 %	1000 cc
Conference	NO	NO	1	80 %	500 cc
Devoe	1	30 %	1	80 %	400 cc (tractament únic al 60% floració)
Decana de Comice	3	30 %	2	80 %	600 cc (tractament únic al 60% floració)
Delbard Première	NO	NO	0.5	80 %	-
Ercolini	1	30 %	1	80 %	400 cc
William's	NO	NO	0.5	80 %	450 cc

(*) És important no barrejar amb **FENGIB** cap adob foliar ric en nitrogen ni aminoàcids. Tampoc ho apliqueu després d'una gelada.

B) ESTRATÈGIA 2. Amb PROMALIN: 6-Benziladenina + Giberelines (GA4 + GA 7)

	1 ^a Aplicació 30% floració	2 ^a Aplicació 80% floració
	PROMALIN per 1000 L	PROMALIN per 1000 L
Conference	250 cc	250 cc

	1 ^a Aplicació 20% floració	2 ^a Aplicació 50% floració	3 ^a Aplicació 80% floració
	PROMALIN per 1000 L	PROMALIN per 1000 L	PROMALIN per 1000 L
Abate Fetel	250 cc	250 cc	250 cc
Passats 20 dies de caiguda de pètals tractar amb REGALIS PLUS a 1 kg/1000			

C) ESTRATÈGIA 3. Amb AGRITONE: ANA 0,43% + ANA AMIDA 1,18%

	1 ^a Aplicació 20% floració	2 ^a Aplicació 80% floració	3 ^a Aplicació caiguda petals
	AGRITONE per 1000 L	AGRITONE per 1000 L	AGRITONE per 1000 L
Conference	600 gr	600 gr	600 gr

En tots els tractaments de quallat és aconsellable afegir un MULLANT i un adob ric en Bor, Fòsfor i Aminoàcids per millorar l'efecte del quallat.

TRACTAMENT PRE-FLORAL EN POMERA

ESTADI VEGETATIU	MATERIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
ESTADI E - E2 BOTÓ ROSA	Oli de parafina	LAINCOIL, varis
	Flonicamid	TEPPEKI, AFINTO
	Piriproxifen	BRAI, PROXIMO, varis
	Oxiclorur de coure	COBRE LAINCO, OSSIRAM 50, Varis
	Sistèmic (mota/cendrosa)	LUNA EXPERIENCE

TRACTAMENT CAIGUDA PÈTALS PINYOL

CONTROL	MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE
Monilia, cendrosa,	Tebuconazol o Fluopyram+Tebuconazol	ORIOUS o LUNA EXPERIENCE
Cribat	Captan	MERPAN, Varis
Cendrosa	Sofre	COSAVET, SOFRE VALLES
Pugons i trips	Acetamiprid	CARNADINE

TRACTAMENT CAIGUDA PÈTALS AMETLLER

CONTROL	MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE
Monilia, cribat i arrufat	Difenoconazol	SCORE 25 (1)
Pugons	Lambda Cihalotrin o Deltametrin	KARATE ZEON o SUPERDELTA, RITMUS

(1) Únic Difenoconazol que té registre en ametller.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Albert Alsina 637 897 570

Sebastian Cela 663 708 753 * Andrea Colomina 662 292 906 * Maria Rosa Llombart 674325308

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

e-mail: info@coopivars.coop

www.coopivars.coop



@coopivars