



ASSEGURANÇA DE FRUITA

El període de contractació de l'assegurança d'explotació en fruiters, línia 300, **finalitza el proper 28 de febrer**. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.

PERERA. Preventiu plaques i malalties

Les pluges abundants durant els mesos de gener i febrer, fan preveure una proliferació de fongs i bacteris. Alhora observem postes i eclosions de psil·la sobre les lamburdes de pereres.

Recomanem realitzar el següent tractament:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per ha	OBSERVACIONS
OSSIRAME 50	Oxiclorur de coure 50%	3 Kg	Fongs i bacteris
SYNERGY	Aminoàcids millorants del brou	3 L	Postes i nimfes de psil·la

ADOBAT DE COBERTORA EN CEREAL D'HIVERN

Es recorda que els límits màxims de nitrogen que es poden aplicar en cereal d'hivern, tant per reg com per secà, són els que regula el Decret 153/2019 i que es mostren a la taula següent:

Cultiu	Secà / Reg	Límits màxims de nitrogen (kg N/ha)		
		N total	N orgànic (Purí, fem)	N mineral
Blat, ordi	Secà	170	170	120
	Reg	210	170	150

Per ajustar la quantitat de nitrogen a aportar en cobertora es recomana fer analítiques de sòls i tenir en compte la quantitat d'adob que s'ha aportat en fons (orgànic o mineral).

- ✓ En finques on **NO** s'ha fet cap aplicació d'adob en fons es recomana aplicar adobs complexes tipus 20-7-10 a una dosi de 250-300 kg/jornal (110-140 kg N/ha).


- ✓ En finques on **SÍ** s'ha fet una aplicació d'adob en fons es recomana aplicar adobs nitrogenats tipus DURAMON 26.
 - SI s'ha aplicat adob mineral en fons es recomana aplicar 150-200 kg/jornal (80-110 kg N/ha).
 - SI s'han aplicat dejeccions ramaderes en fons es recomana reduir l'aportació d'adob en cobertora i ajustar les unitats fertilitzants.

HERBICIDA EN CEREAL D'HIVERN

Es presenten possibles estratègies per a controlar males herbes en cereals d'hivern:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per ha	FULLA AMPLA	MARGALL	COGULA	ESCALDA -BOQUES	OBSERVACIONS
KINVARA CLADDA	MCPA 23,3% + Fluroxipir 5% + Clopiralida 2,8%	2-3 L	SI	-	-	-	-
INTENSITY	Aminopirialid 30% + Florasulam 15%	33 g	SI	-	-	-	Residual. Afegir 1 L PG Supermojante
QUELEX	Halauxifen-metil 10,42% + Florasulam 10%	30-50 g	SI	-	-	-	Afegir 500 cc VIVOLT
TREZAC	Halauxifen-metil 3,13% + Aminopirialid 2,5%	200 cc	SI	-	-	-	Afegir 500 cc VIVOLT
AXIAL PRO	Pinoxaden 6%	0,5-1 L	-	SI	SI	-	La barreja amb hormonals, fa perdre eficàcia
KAMPAI	Florasulam 0,18% + Fluroxipir -metil 7,5% + Pinoxaden 3%	1,5-2 L	SI	SI	SI	-	Blat i ordi
ATLANTIS ACTIV	Iodosulfuron-metil-sodio 0,9% + Mesosulfuron-metil 4,5% (sal sódica) + Tiencazolina-metil 1,5% (sal sódica)	250-330 g	SI	SI	SI	SI	Sols en blat o triticle. Afegir 800 cc/ha Biopower
BROADWAY	Florasulam 1,42% + Piroxsulam 7,08%	265 g	SI	SI	SI	SI	Sols en blat o triticle. Afegir 1 L PG Supermojante. No controla roella resistent

Per ajustar les dosi i barreges a cada finca en concret, consultar al servei tècnic.



FUNGICIDES EN ORDI

Quan les condicions climatològiques siguin favorables per entrar a les finques, i atesa la simptomatologia evident de clorosi generalitzada als sembrats, es considera necessari una aplicació de fertilització nitrogenada de cobertura, amb l'objectiu de corregir possibles dèficits nutricionals i optimitzar el desenvolupament vegetatiu del cultiu.

Alhora, es proposa la realització d'un tractament fungicida preventiu per tal de minimitzar el risc d'afectacions fito-patològiques i preservar el potencial productiu de la parcel·la.

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per ha	OBSERVACIONS
AVIATOR XPRO	Bixafen 7,5% + Protioconazol 15%	600 cc	És una dosi preventiva

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.
Rafael Pina 607 193 239 Mar Ribalta 652 095 917
Sebastian Cela 663 708 753 Maria Rosa Llombart 674325308

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**